



Animal Natural Health  
www.dqsa.com.co

Disponible en DQSA:



Registro MIDA RF-4055-07

# COLISTIN 400

*En Aves y en Cerdos para el tratamiento de enfermedades entéricas.*

## INDICACIONES DE USO:

En aves (Pollo de engorde y pollas de reemplazo) y porcinos para el tratamiento de enfermedades entéricas producidas por *Escherichia coli*, *Pseudomona sp.*, y *Klebsiella sp.*, *Salmonella sp.*, *Bordetella sp.*, *Shigella sp.*, *Pseudomona auroginosa*.

## MODO DE USO:

### Dosificación:



**CERDOS:** De 250 a 300 gramos de COLYSTIN 400 por tonelada de alimento balanceado.



**AVES:** como promotor de crecimiento entre 10 a 20 ppm que corresponde de 25 a 50 g de Colystin 400 por tonelada de alimento.

**Curativo:** administrar de 5 a 6 mg de Colystin 400 por Kg de peso vivo.

En ponedoras con peso de 2 kg utilizar 200 -250 g por tonelada de alimento.

Para pollo de engorde con peso de 1 kg, utilizar 100 a 125 g de Colystin 400 por tonelada de alimento.

## TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 1 días después de finalizado el tratamiento.

## PRECAUCIONES

- USO VETERINARIO
- Utilizar el producto solamente en las especies propuestas.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto bien cerrado, almacenado en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
- El operario debe usar mascarilla, guantes, gafas de seguridad e indumentaria adecuada para la mezcla.
- Venta bajo formula del veterinario

PRODUCIDO POR: DQSA PANAMA S.A.  
Tecnoparque Ciudad del Saber  
Avenida Rosa Elena Landechi,  
Galera 246 Clayton, Corregimiento de Ancón  
Provincia de Panama  
Teléfono 317-0141  
República de Panama.

¡ Llámenos ! 57 (1) 418 1125  
57 (1) 418 1136 / 316 473 7366



Si requiere mayor información acerca del producto consulte con su asesor de confianza o en [www.dqsa.com.co](http://www.dqsa.com.co)