DQSA
Animal Natural Health
www.dqsa.com.co

DQMEC 1.0%

Antiparasitario interno y externo de larga acción

INDICACIONES DE USO:



Para el tratamiento y control de los siguientes parásitos internos y externos en:
BOVINOS: efectivos para el control y tratamiento en el control de: **PARASITOS INTERNOS** como: Nematodos gastrointestinales incluyendo las larvas de Ostertagia ostertagi inhibida, parásitos pulmonares Dictyocaulus viviparus, Parafilaria bovivola, Thelazia sp. **PARASITOS EXTERNOS** como: Nuche Dermatobia hominis, Piojos Linognathus vituli, Haematopinus Eurysternus, Solonopotes capillatus. Coadyuvante en el control de piojos masticadores Damasina bovis, ácaros de la sarna Psoroptes communis var bovis, Sarcoptes scabiei var bovis, Chorioptes bovis. Ayuda en el control de las garrapatas Rhipicephalus microplus.

CERDOS: efectivo para el control y tratamiento en el control de **PARÁSITOS INTERNOS** como: nematodos gastrointestinales Ascaris summ, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum sp., Trichuris suis, Strongyloides ransomi., parásitos pulmonares Metastrongylus sp. **PARASITOS EXTERNOS** como piojos Haematopinus suis, ácaros de la sarna Sarcoptes scabiei car suis.

MODO DE USO:

En anaplasmosis: aplicar 10 mL. por cada 100 Kg. de peso vivo, que aporta 10 mg. por Kg. de peso vivo, diariamente. Duración del tratamiento según el criterio del Médico Veterinario. Otras enfermedades: 5 mL. por cada 100 Kg. de peso vivo, que aporta 5 mg. por Kg. de peso vivo, diariamente. Duración del tratamiento según el criterio del Médico Veterinario. No inyectar por vía intramuscular más de 20 mL. por el mismo sitio. Para lavado uterino: Diluir 20 mL. en 100 mL. de agua destilada. Repetir durante 4 días seguidos o según criterio del Médico Veterinario.

FORMA FARMACÉUTICA:

Solución inyectable.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Subcutánea.

TIEMPO DE RETIRO:

Los bovinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.
Los cerdos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento.

PRECAUCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Utilizar el producto únicamente en las especies propuestas.
- Las ajugas y jeringas utilizadas deben estar esterilizadas y conservar asepsia en el proceso de aplicación.
- No aplicar por vía intravenosa, ni intramuscular.
- No aplicarlo en vacas en producción de leche para consumo humano.
- No aplicarlo 28 días antes del parto.

¡ Llámenos ! 57 (1) 418 1125
57 (1) 418 1136 / 316 473 7366

Si requiere mayor información acerca del producto consulte con su asesor de confianza o en www.dqsa.com.co