



Animal Natural Health  
www.dqsa.com.co

Disponible en DQSA:



Registro MIDA RF-4717-09

# MONECYL

*Para el control de coccidiosis.*

## INDICACIONES DE USO:

Se emplea para el control de coccidiosis en AVES.  
Premezcla Anticoccidial formulada con Monensina Sódica.  
Para el control de coccidiosis causadas por Eimeria acervulina, E. Brunetti, E. Mivati, E. Necatrix, E. Máxima, E. Tenella.

## MODO DE USO:

### Dosificación:

Mezclar 500 g. de Monecyl / ton. de alimento, proporcionando así 100 g. de actividad de Monensina Sódica / Ton Alimento para pollos de engorde y pollas de reemplazo para postura.

Es preciso hacer una premezcla inicial con 500 gramos de Monecyl en 40 Kg de alimento concentrado y adicionarlo a la tolva para el mezclado final.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Se administra oral, mezclado con el alimento.

## TIEMPO DE RETIRO:

En pollas de reemplazo suprimir el tratamiento 10 días antes del inicio de la postura. Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 4 días después de finalizado el tratamiento.

## PRECAUCIONES

- USO VETERINARIO
- No administrar el producto en equinos.
- Utilizar el producto en la especie propuesta.
- Dosificar en la forma indicada y no exceder la dosis.
- No usar en ponedora en producción de huevos destinados al consumo humano ni en pavos.
- Consérvese en lugar fresco y seco protegido de la luz solar.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

PRODUCIDO POR: DQSA PANAMA S.A.  
Tecnoparque Ciudad del Saber  
Avenida Rosa Elena Landechi,  
Galera 246 Clayton, Corregimiento de Ancón  
Provincia de Panama  
Teléfono 317-0141  
República de Panama.

¡ Llámennos ! 57 (1) 418 1125  
57 (1) 418 1136 / 316 473 7366



Si requiere mayor información acerca del producto consulte con su asesor de confianza o en [www.dqsa.com.co](http://www.dqsa.com.co)